


## واکسن کرونا در ۱-۲-۳

تا تعداد افراد واکسینه بیشتر باشد،  
سریعتر میتوانیم جامعه را بازگشایی کنیم



در شاروالی فردریکستاد میتوانید با مراجعه به این وبسایت به صف واکسن ببیونددید  
[www.fredrikstad.kommune.no/vaksine](http://www.fredrikstad.kommune.no/vaksine)

شما به BankID به عنوان شناسه احتیاج دارید.  
وقتی نوبت شما رسید احضار می شوید.

با تلفون واکسن ما از طریق نمبر ۰۸ ۱۱ ۳۸ ۶۹ تماس بگیرید (گزینه ۳)

برای معلومات بیشتر در مورد واکسن در فردریکستاد میتوانید به اینجا مرجعه کنید:  
[www.fredrikstad.kommune.no/vaksine](http://www.fredrikstad.kommune.no/vaksine)

### عوارض جانبی واکسن


همه واکسیناسیون ها میتوانند عوارض جانبی ایجاد کنند.  
واکسن کرونا هم همینطور میباشد. بدن بعد از دریافت واکسن، از خود در برابر ویروس دفاع میکند. وقتی بدن این سیستم دفاع را درست میکند، میتوانید علائمی داشته باشید که شبیه علائمی است که در صورت مبتلا به بیماری کرونا دچار آن میشوید. به این عوارض جانبی گفته میشود.

### عوارض جانبی چیست؟

عوارض جانبی میتواند شامل سردرد، خستگی، تب، درد عضلات و مفاصل باشد. قسمی ممکن است در محل تزریق آمپول نیز احساس درد داشته باشند. عوارض جانبی اغلب فقط برای ۱ تا ۲ روز ادامه خواهد داشت.

### چه کسی دچار عوارض جانبی میشود؟

تقریباً نیمی از کسانی که واکسن دریافت میکنند، در درجات مختلف ممکن است دچار چنین عوارضی شوند، در بیشتر آنها علائم بسیار خفیف مشاهده میشود. اگر علائم شدیدی داشتید، با داکتر عمومی خود یا اورژانس تماس بگیرید.



برای معلومات بیشتر در مورد واکسن در فردریکستاد به اینجا مراجعه کنید:  
[www.fredrikstad.kommune.no/vaksine](http://www.fredrikstad.kommune.no/vaksine)

# رهنمود مختصر برای واکسین کروناویروس

معلومات مختصر درباره واکسین کوید-19 (کروناویروس) از طرف انستیتوت صحت عامه ناروی

## این واکسین چه قسم کار میکند؟

این واکسین بدن با جسم را یاد میدهد که کروناویروس را شناسایی و تشخیص کند و در مقابل آن از خود دفاع کند.

این واکسین به سرعت از بدن دفع میشود.

البته، جسم و بدن نحوه دفاع از خودش را در مقابله با ویروس به یاد می آورد.




## عوارض جانبی

این واکسین بالای هزاران نفر در مطالعات تحقیقاتی وسیع تست شده است. عوارض جانبی شایع عبارتند از:

- درد در ناحیه زرق پیچکاری
- ماندگی
- سردردی
- درد جسم و بدن
- تب یا لرز

این عوارض جانبی ناراحت کننده میباشد اما بعد از چند روز از بین میرود.



## عوارض جانبی غیر شایع

اگر شما بعد از زرق و تطبیق واکسین به اعراض و علائم غیرمنتظره، حاد یا دوامدار مبتلا شدید، با یک دکتر یا یک متخصص صحتی دیگر به تماس شوید.




اگر میخواهید معلومات بیشتری را درباره واکسین کروناویروس بدانید، به ویبسایت انستیتوت صحت عامه ناروی مراجعه کنید:  
<https://www.fhi.no/kvp>

## درباره واکسین کروناویروس \*

این واکسین برای هر شخصی که توصیه شده، ارائه خواهد شد.

این واکسین رایگان است.

این واکسین از مریضی کوید-19 محافظت میکند.




## باید واکسین را چه قسم اخذ و دریافت کنید؟

این واکسین به شکل پیچکاری بالای بازوی شخص زرق و تطبیق میشود.

بعضی از واکسین ها به دو دوز و با فاصله چند هفته از یکدیگر زرق و تطبیق میشود.


اگر شما حامله هستید، الرجی دارید، کدام دوا استفاده میکنید، مریض هستید، یا کوید-19 داشته اید، آنرا اعلام نمایید.



## این واکسین چقدر موثر است؟

اکثر اشخاص، در جریان 1-2 هفته بعد از تکمیل واکسین خود، در مقابل مریضی کوید-19 محافظت میشوند.

حتی اگر شما واکسین شده اید، توصیه های جلوگیری از عفونت را مراعات کنید.



\*این واکسین شامل اجزای بدن خوک یا سایر اجزای تغذیه ای نمیشود.